

Варденафил

В препаратах на основе Варденафила основным действующим веществом является варденафила моногидрохлорида тригидрат.

Показания к применению

Это средство рекомендовано для тех, кто нуждается в коррекции/лечении эректильных отклонений и импотенции, в том числе застарелой. Восстанавливая дисфункцию такого рода, препарат способствует проявлению реакции у мужчины на сексуальное возбуждение. Физиологически состояние эрекции полового члена достигается благодаря расслаблению гладких мышц кавернозных тел. Действие средств на основе Варденафила направлено на усиление активности оксида азота, выделяющегося в нервных окончаниях при половом возбуждении. Это воздействие ведет к значительной активации кровообращения в области пениса и делает возможным осуществление полноценного сексуального контакта.

Противопоказания

Прежде чем начать лечение рекомендуется получить врачебную консультацию с целью определить допустимость приема средств на основе Варденафила в каждом случае индивидуально.

Основными противопоказаниями являются следующие:

- наличие заболеваний сердца или сосудистой системы, при которых сексуальная активность является рискованной
- нестабильность артериального давления либо наличие хронической гипотонии
- стенокардия
- перенесенный до полугода назад инфаркт миокарда/инсульт
- сердечная недостаточность
- тяжелые болезни печени
- почечная недостаточность тяжелой стадии (включая гемодиализных больных)
- пигментный ретинит и другие дегенеративные болезни сетчатки глаза, обусловленные наследственностью
- одновременный прием вместе с другими, корректирующими импотенцию лекарственными средствами

Эректильная дисфункция лечится с учетом индивидуальных показаний у пациентов с активной стадией пептической язвы, а также у тех, кто имеет риск кровотечений. Пациенты с искривленным пенисом, заболеванием Пейрони, кавернозным фиброзом также должны лечиться препаратами с содержанием Варденафила с осторожностью.

Способ приема и рекомендуемые дозировки

Способ приема средства – внутрь независимо от времени, когда принималась пища, а также формы выпуска препарата – таблетированной, капсулированной, с содержимым в виде желе, гелевой и пр. Наступление эффекта при приеме препаратов на основе Варденафила ожидается в промежутке от десяти минут до получаса, но не позже. Это зависит от того, в какой форме принятое средство (таблетированная действует немного позже других форм). Прием препарата рекомендован минимум за полчаса, а максимум за четыре-пять часов до начала

сексуальной активности. Действие средства проявится только если присутствует достаточное сексуальное возбуждение.

Первоначальной дозой считается 10 миллиграмм. Но при удовлетворительной переносимости препарата и по необходимости, дозу средства допустимо довести до 20 миллиграмм, что является рекомендуемым максимумом для разового суточного приема. Пациентам пожилого возраста – от 65 лет – рекомендуется начальная доза 5 миллиграмм. Тем, у кого присутствуют незначительные сбои в работе печени и почек дозировка стандартная. Средняя степень заболевания печени требует соблюдения начальной дозировки в 5 (максимально 10) миллиграмм препарата.

Побочные эффекты

Как правило, при приеме средств на основе Варденафила побочные эффекты проявляются слабо или умеренно. Частота проявления и степень выраженности побочных реакций чаще всего зависит от принятой дозы, а также индивидуальной переносимости.

Из побочных эффектов возможны:

- головокружения и головная боль
- приливы крови к лицу
- тошнота, рвота, диарея
- заложенность носа, сходная с ринитом
- отечность, в том числе аллергический отек гортани
- болезненные ощущения в области груди, стенокардия
- скачки артериального давления
- ишемия, инфаркт миокарда
- тахикардия, сердцебиение
- ощущение сухости во рту
- изменения в печеночных пробах
- артралгия, болезненные ощущения в спине и шее
- сонливость
- носовое кровотечение
- сыпь на коже, зуд
- повышенная потливость
- судороги в мышцах
- нарушения в органах зрения – нечеткость видения, болезненность в глазах, светочувствительность, ухудшение цветоразличения

Крайне редко сообщалось о случаях длящейся свыше 4-х часов и болезненной эрекции (приапизм). Проявления приапизма требуют своевременного лечения, так как возможны серьезные повреждения тканей пениса, что может приводить к долговременной импотенции.

Лекарственное взаимодействие

Совместный прием препаратов на основе Варденафила и нитратов, донаторов оксида азота в любой форме запрещен по причине опасности развития артериальной гипотензии.

Пациенты, получающие лечение такими антиаритмиками как прокаинамид, соталол, амиодарон, а также хинидин должны исключить прием средств, в составе которых есть Варденафил.

Сопутствующая терапия некоторыми ингибиторами, к которым относится ритонавир, эритромицин и кетоконазол требует корректировки принимаемой дозы.

У тех, кто принимает альфа-адреноблокаторы одновременное применение средств на основе Варденафила способно вызвать значительное понижение артериального давления. Такое же воздействие наблюдалось при совместной терапии с нифедипином.

Одновременный прием с алкогольными напитками допустим при условии умеренного употребления последних. При соблюдении данного условия в исследованиях не отмечали изменений плазменных уровней алкоголя и Варденафила.

Тем пациентам, которые корректируют свертываемость крови с помощью ацетилсалициловой кислоты (аспирина) или осуществляют терапию варфарином, допустимо применение средств, содержащих Варденафил.

Хранение препарата

Условия хранения — в сухом прохладном месте, вдали от детей и животных.